

RMM pripreme 2015 – Algebra

sastavio: Kristina Ana Škreb

- 1. zadatak:** (Rumunjska 2015) Neka su $a, b, c > 0$ realni brojevi takvi da je $a + b + c = 1$. Dokaži da je

$$\frac{bc + a + 1}{a^2 + 1} + \frac{ca + b + 1}{b^2 + 1} + \frac{ab + c + 1}{c^2 + 1} \leq \frac{39}{10}.$$

- 2. zadatak:** (Vijetnam 1992) Neka je $f(x)$ nekonstantni polinom s realnim koeficijentima. Dokaži da za svaki $c > 0$ postoji prirodan broj n_0 koji zadovoljava sljedeći uvjet:

Za svaki polinom $P(x)$ s realnim koeficijentima i vodećim koeficijentom 1 koji je stupnja barem n_0 broj cijelih brojeva a za koje je

$$|f(P(a))| \leq c$$

nije veći od stupnja od P .

- 3. zadatak:** (Vijetnam 1998) Nađi sve polinome $P(x)$ s cjelobrojnim koeficijentima i vodećim koeficijentom 1 koji zadovoljavaju sljedeće svojstvo: postoji beskonačno mnogo iracionalnih brojeva α takvih da je $P(\alpha) \in \mathbb{N}_0$.

- 4. zadatak:** (Vijetnam 2000) Dan je $k \in \mathbb{N}$. Definiramo niz brojeva $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ na sljedeći način:

(i) $x_1 = 1$,

(ii) za $n \in \mathbb{N}$, x_{n+1} je najmanji prirodan broj koji ne pripada skupu $\{x_1, x_2, \dots, x_n, x_1 + k, x_2 + 2k, \dots, x_n + nk\}$.

Pokaži da postoji realan broj α takav da je $x_n = \lfloor n\alpha \rfloor$ za sve $n \geq 1$.

- 5. zadatak:** (Bjelorusija 2015) Postoje li $a, b \in \mathbb{R}$ i surjeksija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takva da vrijedi

$$f(f(x)) = bxf(x) + a$$

za sve $x \in \mathbb{R}$?

- 6. zadatak:** (Koreja 2013) Dan je prirodan broj n i $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ bijeksija. Definirani su skupovi A, B, C, D na sljedeći način:

$$A = \{i : i > f(i)\}$$

$$B = \{(i, j) : i < j \leq f(j) < f(i) \text{ ili } f(j) < f(i) < i < j\}$$

$$C = \{(i, j) : i < j \leq f(i) < f(j) \text{ ili } f(i) < f(j) < i < j\}$$

$$D = \{(i, j) : i < j \text{ i } f(i) > f(j)\}.$$

Dokaži da je $|A| + 2|B| + |C| = |D|$.

7. zadatak: (Rumunjska 2014) Dani su prirodni brojevi $n \geq m \geq 4$ i $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ podskup od $\{1, 2, \dots, n\}$ takav da za sve $a, b \in A$, $a \neq b$ vrijedi

$$a + b \leq n \implies a + b \in A.$$

Dokaži da je

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_m}{m} \geq \frac{n+1}{2}.$$

8. zadatak: (Tajland 2013) Odredi sve funkcije $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ za koje je

$$(x^2 + y^2)f(xy) = f(x)f(y)f(x^2 + y^2)$$

za sve $x, y \in \mathbb{R}$.

Ostali izabrani zadaci

1. (Vijetnam 2004) Nađi sve realne brojeve α za koje postoji jedinstvena funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ koja zadovoljava jednadžbu

$$f(x^2 + y + f(y)) = (f(x))^2 + \alpha y$$

za sve $x, y \in \mathbb{R}$.

2. (Vijetnam 2005) Neka su $a, b, c > 0$. Dokaži da je

$$\left(\frac{a}{a+b}\right)^3 + \left(\frac{b}{b+c}\right)^3 + \left(\frac{c}{c+a}\right)^3 \geq \frac{3}{8}.$$

3. (RMM 2015) Postoji li niz prirodnih brojeva a_1, a_2, a_3, \dots takav da su a_m i a_n relativno prosti ako i samo ako je $|m - n| = 1$.
4. (Bjelorusija 2015) Pronađi sve parove polinoma $P(x)$ i $Q(x)$ s realnim koeficijentima za koje vrijedi

$$P(x^2) = P(x)Q(1-x) + P(1-x)Q(x)$$

za sve $x \in \mathbb{R}$.